

Dernière mise à jour le 03/09/2025

## HEPARGITOL, poudre orale en sachet bipoche

Fiche info

Résumé des caractéristiques du produit

Notice

ANSM - Mis à jour le : 06/01/2012

### Dénomination du médicament ↑

HEPARGITOL, poudre orale en sachet bi-poche

### Encadré ↑

**Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.**

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

### Sommaire notice ↑

#### Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE HEPARGITOL, poudre orale en sachet bi-poche ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE HEPARGITOL, poudre orale en sachet bi-poche ?
3. COMMENT PRENDRE HEPARGITOL, poudre orale en sachet bi-poche ?

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

5. COMMENT CONSERVER HEPARGITOL, poudre orale en sachet bi-poche ?

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

## 1. QU'EST-CE QUE HEPARGITOL, poudre orale en sachet bi-poche ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ? [↑](#)

### Classe pharmacothérapeutique [↑](#)

Sans objet.

### Indications thérapeutiques [↑](#)

Ce médicament facilite la digestion et est laxatif.

Il est préconisé en cas de digestion difficile et en cas de constipation.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE HEPARGITOL, poudre orale en sachet bi-poche ? [↑](#)

### Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament [↑](#)

Sans objet.

### Contre-indications [↑](#)

**Ne prenez jamais HEPARGITOL, poudre orale en sachet bi-poche dans les cas suivants:**

- certaines maladies de l'intestin et du côlon
- en cas de douleurs abdominales (douleurs du ventre).

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDEE L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

### Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales [↑](#)

Faites attention avec HEPARGITOL, poudre orale en sachet bi-poche:

Mises en garde

Pas d'utilisation prolongée sans avis médical.

### **Constipation occasionnelle:**

Elle peut être liée à une modification récente du mode de vie (voyage). Le médicament peut être une aide en traitement court. Toute constipation récente inexplicée par le changement du mode de vie, toute constipation accompagnée de douleurs, fièvre, de gonflement du ventre doit faire demander l'avis du médecin.

### **Constipation chronique (constipation de longue durée):**

Elle peut être liée à deux causes:

- soit une maladie de l'intestin qui nécessite une prise en charge par le médecin
- soit à un déséquilibre de la fonction intestinale dû aux habitudes alimentaires et au mode de vie.

Le traitement comporte entre autres:

- une augmentation des apports alimentaires en produits d'origine végétale (légumes verts, crudités, pain complet, fruits....)
- une augmentation de la consommation d'eau et de jus de fruits:
- une augmentation des activités physiques (sport, marche...)
- une rééducation du réflexe de défécation
- parfois, l'adjonction de son à l'alimentation.

Il est utile de prendre conseil auprès de votre médecin ou de votre pharmacien.

### **Cas particuliers chez l'enfant:**

Chez l'enfant le traitement de la constipation est basé sur des mesures d'hygiène de vie et de diététique: notamment utilisation de la bonne quantité d'eau avec les poudres de lait infantiles, alimentation riche en produits d'origine végétale, adjonction du jus de fruits.

Le traitement de longue durée par un laxatif est déconseillé chez l'enfant car la prise régulière peut entraver le fonctionnement normal du réflexe de défécation.

**EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.**

### **Précautions d'emploi**

- En cas de régime désodé, tenir compte dans la ration journalière de 0,277 g de sodium par paquet bi-poche.
- Prévenir le médecin en cas de calculs de la vésicule biliaire.
- En cas de colites, diminuer la posologie et éviter la prise du médicament à jeun.
- En cas de diabète, tenir compte de la présence de 0,500 g de saccharose par paquet bipoche.

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

NE JAMAIS LAISSER A LA PORTEE DES ENFANTS.

## **Interactions avec d'autres médicaments** ↑

**Prise ou utilisation d'autres médicaments:**

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

## **Interactions avec les aliments et les boissons** ↑

Sans objet.

## **Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives** ↑

Sans objet.

## **Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement** ↑

**Grossesse - allaitement**

Ce médicament dans les conditions normales d'utilisation peut être utilisé pendant la grossesse et l'allaitement.

D'une façon générale, il convient de demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

## **Sportifs** ↑

Sans objet.

## **Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines** ↑

Sans objet.

## **Liste des excipients à effet notoire** ↑

**Liste des excipients à effet notoire:** saccharose, sodium

### 3. COMMENT PRENDRE HEPARGITOL, poudre orale en sachet bi-poche ? ↑

#### Instructions pour un bon usage ↑

Sans objet.

#### Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement ↑

Verser le contenu des 2 poches du paquet dans un demi-verre d'eau et agiter.

Pour le traitement d'appoint de la constipation: prendre deux paquets à jeun.

En cas de digestion difficile: prendre le produit avant les repas ou au moment des troubles dans un demi-verre d'eau.

Chez l'adulte: 2 à 4 paquets par jour.

Chez l'enfant de plus de 2 ans: 1 à 2 paquets par jour selon l'âge.

#### Symptômes et instructions en cas de surdosage ↑

Si vous avez pris plus de HEPARGITOL, poudre orale en sachet bi-poche que vous n'auriez dû:

- risque de diarrhées en cas d'utilisation excessive.

Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

#### Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses ↑

Sans objet.

#### Risque de syndrome de sevrage ↑

Sans objet.

### 4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ? ↑

#### Description des effets indésirables ↑

Comme tous les médicaments, HEPARGITOL, poudre orale en sachet bi-poche est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet:

- diarrhées

- douleurs abdominales.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

## 5. COMMENT CONSERVER HEPARGITOL, poudre orale en sachet bi-poche ? ↑

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

### Date de péremption ↑

Ne pas utiliser HEPARGITOL, poudre orale en sachet bi-poche après la date de péremption mentionnée sur le conditionnement extérieur.

### Conditions de conservation ↑

Pas de conditions particulières de conservation.

## Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration ↑

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

## 6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES ↑

### Liste complète des substances actives et des excipients ↑

Que contient HEPARGITOL, poudre orale en sachet bi-poche ?

#### Les substances actives sont:

##### Poche A

Sorbitol ..... 1,8450 g

Acide citrique ..... 0,8780 g

Pour une poche.

##### Poche B

Chlorhydrate d'arginine .....	0,5000 g
Sorbitol .....	1,5700 g
Sulfate de sodium anhydre .....	0,0660 g
Hydrogénophosphate de sodium .....	0,1190 g

Pour une poche.

**Les autres composants sont:**

Poche A: saccharose, huile essentielle d'orange, huile essentielle de citron naturelle concentrée.

Poche B: bicarbonate de sodium, saccharose.

**Forme pharmaceutique et contenu ↑**

**Qu'est-ce que HEPARGITOL, poudre orale en sachet bi-poche et contenu de l'emballage extérieur ?**

Ce médicament se présente sous forme de poudre orale en sachet bi-poche. Boîte de 10 ou 20 sachets.

**Nom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l'autorisation de fabrication responsable de la libération des lots, si différent ↑**

Titulaire

LABORATOIRE DES REALISATIONS THERAPEUTIQUES ELERTE

181 - 183, RUE ANDRE KARMAN

BP 101

93303 AUBERVILLIERS CEDEX

Exploitant

Non renseigné.

Fabricant

Non renseigné.

**Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen ↑**

Sans objet.

## **Date d'approbation de la notice** ↑

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le {date}.

## **AMM sous circonstances exceptionnelles** ↑

Sans objet.

## **Informations Internet** ↑

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Afssaps (France).

## **Informations réservées aux professionnels de santé** ↑

Sans objet.

## **Autres** ↑

Sans objet.



**MINISTÈRE  
DU TRAVAIL, DE LA SANTÉ,  
DES SOLIDARITÉS  
ET DES FAMILLES**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

[legifrance.gouv.fr](https://legifrance.gouv.fr)

[gouvernement.fr](https://gouvernement.fr)

[service-public.fr](https://service-public.fr)

[data.gouv.fr](https://data.gouv.fr)

---

Nos partenaires



HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ



Sauf mention contraire, tous les contenus de ce site sont sous [licence etalab-2.0](https://www.etalab.info/fr/collectif/licence-etalab-2.0)