



MÉDICAMENT GÉNÉRIQUE :  
IL A PLUSIEURS CORDES À SON ARC



EN SAVOIR +



[Accueil](#) | [Glossaire](#) | [Aide](#)

Dernière mise à jour le 03/08/2017

## SOMMAIRE

[Description médicament](#)  
[Informations](#)  
[Utilisation](#)  
[Effets indésirables](#)  
[Conservation](#)  
[Info. supplémentaires](#)

## Fiche info

## Résumé des caractéristiques du produit

## Notice

### UVESTEROL VITAMINE A.D.E.C., solution buvable - Notice patient



ANSM - Mis à jour le : 06/01/2017

#### Dénomination du médicament

UVESTEROL VITAMINE A.D.E.C., solution buvable

#### Encadré

**Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien ou votre infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. voir rubrique 4.

#### Sommaire notice

#### Que contient cette notice :

1. QU'EST-CE QUE UVESTEROL VITAMINE A.D.E.C., solution buvable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER UVESTEROL VITAMINE A.D.E.C., solution buvable ?
3. COMMENT PRENDRE UVESTEROL VITAMINE A.D.E.C., solution buvable ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER UVESTEROL VITAMINE A.D.E.C., solution buvable ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES.

#### 1. QU'EST-CE QUE UVESTEROL VITAMINE A.D.E.C., solution buvable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ? ↴

#### Classe pharmacothérapeutique

VITAMINES

#### Indications thérapeutiques

Ce médicament est indiqué chez le nouveau-né (en particulier le nouveau-né prématuré) et le nourrisson présentant un risque de carence ou de malabsorption en vitamines A, D, E et C.

#### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER UVESTEROL VITAMINE A.D.E.C., solution buvable ? ↴

#### Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Sans objet.

#### Contre-indications

**Ne prenez jamais UVESTEROL VITAMINE A.D.E.C., solution buvable** dans les cas suivants :

- allergie aux principe(s) actif(s) ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.
- hypercalcémie (taux anormalement élevé de calcium dans le sang),
- hypercalciurie (taux anormalement élevé de calcium dans les urines),
- lithiase calcique (calcul rénal).

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

## **Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales**

### **Avertissements et précautions**

Adressez-vous à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre infirmier/ère avant d'utiliser UVESTEROL VITAMINE A.D.E.C, solution buvable.

Des cas de fausse route ou de malaise avec apnée du nourrisson pouvant entraîner une cyanose ont été rapportés chez des nouveau-nés et des nourrissons, sans pathologie connue, lors de l'administration de l'UVESTEROL vitaminé ADEC, et ce, notamment au cours du premier mois de vie (voir rubrique : 4 « Quels sont les effets indésirables éventuels? »).

Par conséquent, afin de limiter ce risque, l'administration de l'UVESTEROL vitaminé ADEC doit s'effectuer en respectant scrupuleusement le mode d'administration du produit détaillé dans la rubrique 3. (« Comment prendre UVESTEROL vitaminé ADEC, solution buvable? »).

En cas de reflux gastro-oesophagien, de problèmes digestifs ou de troubles de la déglutition, ne pas administrer pur, mais dans une tétine adaptée à l'enfant après dilution dans 2ml d'eau ou de lait selon le mode d'allaitement préconisé (voir rubrique 3).

**Les vitamines A et D sont présentes dans de nombreux médicaments. La vitamine D est également présente dans de nombreux laits pour nouveau-né ou nourrisson.**

**Pour éviter tout surdosage, susceptible d'entraîner des effets indésirables graves, tenir compte des doses totales de vitamine D et de vitamine A en cas d'association avec un traitement contenant déjà ces vitamines ou en cas d'utilisation de lait supplémenté en vitamine D.**

**Respectez la posologie et la durée de traitement préconisée par le médecin.**

En cas d'apport complémentaire en calcium, consultez votre médecin.

En raison d'un effet légèrement stimulant de la vitamine C, il est préférable de ne pas prendre ce médicament en fin de journée.

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

PHARMACIEN.

### **Interactions avec d'autres médicaments**

#### **Autres médicaments et UVESTEROL VITAMINE A.D.E.C, solution buvable**

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

### **Interactions avec les aliments et les boissons**

Sans objet.

### **Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives**

Sans objet.

### **Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement**

Sans objet.

### **Sportifs**

Sans objet.

### **Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines**

Sans objet.

### **Liste des excipients à effet notable**

Liste des excipients à effet notable : sans objet.

## **3. COMMENT PRENDRE UVESTEROL VITAMINE A.D.E.C., solution buvable ? ↗**

### **Instructions pour un bon usage**

Afin d'éviter tout risque d'erreur médicamenteuse, la pipette doseuse (SERINGOUTTE) doit être conservée avec le médicament dans l'emballage d'origine.

### **Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement**

#### **Posologie**

La dose habituelle est de 1 dose par jour.

CE MEDICAMENT VOUS A ETE PERSONNELLEMENT DELIVRE DANS UNE SITUATION PRECISE :

- IL PEUT NE PAS ETRE ADAPTE A UN AUTRE CAS.
- NE PAS LE CONSEILLER A UNE AUTRE PERSONNE.

#### **Mode et voie d'administration**

Voie orale.

Afin de limiter le risque de fausse route lors de l'administration du produit, il est particulièrement important de suivre scrupuleusement le mode d'administration du produit.

La solution étant aqueuse, elle peut être administrée dans un biberon de faible volume avant la tétée.

**Mode d'administration chez le nouveau-né prématuré qui tète (jusqu'au terme d'environ 37 semaines) :**

- **Toujours administrer le produit avant la tétée ou le biberon.**
- **Utiliser exclusivement la pipette doseuse pour administration orale fournie dans la boîte (SERINGOUTTE) :**



- **Prélever à l'aide de la pipette (SERINGOUTTE)** jusqu'au trait rouge correspondant à une dose.
- **Diluer cette dose dans un petit volume de lait (environ 2 mL)** dans une tétine adaptée à l'enfant. Si l'enfant est allaité au sein, la dilution peut se faire soit dans le lait de la maman, soit dans de l'eau :



- Prendre **l'enfant éveillé**, l'installer **en position semi-assise** au creux du bras, la tête reposée sur le bras :



- Laisser l'enfant téter doucement la tétine, lui retirer la tétine une fois vide, puis lui donner le sein ou le biberon.



- **Ne pas allonger l'enfant immédiatement après l'administration.**
- Rincer la pipette (SERINGOUTTE) et la tétine à l'eau après chaque utilisation.

#### Mode d'administration chez le nouveau-né à terme et le nourrisson :

- **Toujours administrer le produit avant la tétée ou le biberon.**
- **Utiliser exclusivement la pipette doseuse pour administration orale fournie dans la boîte (SERINGOUTTE) :**



- Prélever à l'aide de la pipette (SERINGOUTTE) jusqu'au trait rouge correspondant à une dose.
- Prendre **l'enfant éveillé**, l'installer **en position semi-assise** au creux du bras, la tête reposée sur le bras :



- Introduire la pipette (SERINGOUTTE) à environ 1 cm dans la bouche et la placer **contre l'intérieur de la joue** :

Laisser téter l'enfant, puis lui donner le sein ou le biberon. Si l'enfant ne tète pas, **appuyer très lentement** sur le piston de la pipette afin que le produit s'écoule **goutte à goutte** dans la bouche ; puis lui donner le sein ou le biberon.



- **Ne pas allonger l'enfant immédiatement après l'administration.**
- Rincer la pipette (SERINGOUTTE) à l'eau après chaque utilisation.

En cas de reflux gastro-œsophagien, de problèmes digestifs ou de troubles de la déglutition :

Ne pas administrer pur, mais dans une tétine adaptée à l'enfant **après dilution** dans un petit volume d'eau ou de lait (environ 2 mL) :



Laisser l'enfant téter doucement la tétine, lui retirer la tétine une fois vide, puis lui donner le sein ou le biberon. Rincer la tétine à l'eau après chaque utilisation.

#### **Fréquence d'administration**

En raison d'un effet légèrement stimulant de la vitamine C, il est préférable de ne pas prendre ce médicament en fin de journée.

#### **Durée du traitement**

Ne pas utiliser de façon prolongée sans l'avis de votre médecin.

#### **Symptômes et instructions en cas de surdosage**

Sans objet.

#### **Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses**

Sans objet.

#### **Risque de syndrome de sevrage**

Sans objet.

### **4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ? ↴**

#### **Description des effets indésirables**

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Des cas de malaise vagal (apnée du nourrisson) et des cas de fausses routes ont été rapportés chez des nouveau-nés et nourrissons, sans pathologie connue, âgés notamment de moins de 1 mois lors de l'administration de l'UVESTEROL Vitaminé ADEC. La cause de ces cas n'a pas été clairement établie à ce jour (voir la rubrique 2 « Quelles sont les informations à connaître avant de prendre UVESTEROL VITAMINE ADEC, solution buvable » et la rubrique 3 « Comment prendre UVESTEROL VITAMINE ADEC, solution buvable »).

#### **Déclaration des effets secondaires**

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, ou à votre pharmacien ou à votre infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (Ansm) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance. Site internet : [www.ansm.sante.fr](http://www.ansm.sante.fr). En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

### **5. COMMENT CONSERVER UVESTEROL VITAMINE A.D.E.C., solution buvable ? ↴**

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

#### **Date de péremption**

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur le flacon après EXP.

La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

#### **Conditions de conservation**

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C et à l'abri de la lumière.

#### **Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration**

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

### **6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES ↴**

#### **Liste complète des substances actives et des excipients**

##### **Que contient UVESTEROL VITAMINE A.D.E.C., solution buvable ?**

##### **La substance active est :**

Concentrat de vitamine A synthétique (forme huileuse) .....	100 000 UI
(Quantité correspondante à .....	58,823 mg)
Ergocalciférol (vitamine D <sub>2</sub> ) .....	33 333 UI
(Quantité correspondante à .....	0,833 mg)
Acétate d'alpha-tocophérol (vitamine E) .....	0,167 g
Acide ascorbique (vitamine C) .....	1,667 g

Pour un flacon de 10 ml

Pour une dose de 0,3 ml = 3000 UI de vitamine A, 1000 UI de vitamine D, 50 mg de vitamine C et 5 mg de vitamine E.

##### **Les autres composants sont :**

Gallate de propyle, arôme fruits rouges (substances aromatisantes naturelles, préparations aromatisantes, propylène glycol, eau), édétate disodique, acide citrique anhydre, phosphate trisodique, sorbate de potassium, saccharine sodique, polysorbate 80, hydroxyde de sodium, eau purifiée.

#### **Forme pharmaceutique et contenu**

##### **Qu'est-ce que UVESTEROL VITAMINE A.D.E.C., solution buvable et contenu de l'emballage extérieur ?**

Ce médicament se présente sous forme de solution buvable incolore à jaunâtre, limpide à légèrement opalescente avec une odeur de fruits rouges.

Ce médicament est disponible en flacon de 10 ml avec pipette doseuse graduée pour administration orale (SERINGOUTTE).

#### **Nom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l'autorisation de fabrication responsable de la libération des lots, si différent**

##### **Titulaire**

**LABORATOIRES CRINEX**  
3, RUE DE GENTILLY  
BP 337

92541 MONTROUGE CEDEX

**Exploitant**

**LABORATOIRES CRINEX**  
3, RUE DE GENTILLY  
BP 337  
92541 MONTROUGE CEDEX

**Fabricant**

**LABORATOIRES CRINEX**  
3, RUE DE GENTILLY  
BP 337  
92541 MONTROUGE CEDEX

**Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen**

Sans objet.

**Date d'approbation de la notice**

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le {date}.

**AMM sous circonstances exceptionnelles**

Sans objet.

**Informations Internet**

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Ansm (France).

**Informations réservées aux professionnels de santé**

Sans objet.

**Autres**

Sans objet.

[Retour en haut de la page](#) ↗

