



## SOMMAIRE

Description médicament  
Informations  
Utilisation  
Effets indésirables  
Conservation  
Info. supplémentaires

## Fiche info

## Résumé des caractéristiques du produit

## Notice

### ULTRA-LEVURE 50 mg, gélule - Notice patient



ANSM - Mis à jour le : 28/12/2022

#### Dénomination du médicament

ULTRA-LEVURE 50 mg, gélule  
*Saccharomyces boulardii* CNCM I-745

#### Encadré

**Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

#### Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que **ULTRA-LEVURE 50 mg, gélule** et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre **ULTRA-LEVURE 50 mg, gélule** ?
3. Comment prendre **ULTRA-LEVURE 50 mg, gélule** ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver **ULTRA-LEVURE 50 mg, gélule** ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

#### **1. QU'EST-CE QUE ULTRA-LEVURE 50 mg, gélule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?**

Classe pharmacothérapeutique : MICROORGANISMES ANTIDIARRHEIQUES - code ATC : A07FA02

Il est indiqué dans le traitement symptomatique d'appoint de la diarrhée, en complément de la réhydratation chez l'adulte et l'enfant de plus de 6 ans.

#### **2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ULTRA-LEVURE 50 mg, gélule ?**

**Ne prenez jamais ULTRA-LEVURE 50 mg, gélule :**

- Si vous êtes allergique à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.
- Si vous êtes porteur d'un cathéter veineux central, immunodéficent ou hospitalisé (en raison d'une maladie grave ou si votre système immunitaire est affaibli).

#### **Avertissements et précautions**

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre **ULTRA-LEVURE 50 mg, gélule**

##### Avertissements

Il est recommandé de ne pas ouvrir les gélules dans l'environnement de patients porteurs d'un cathéter veineux central, pour éviter toute colonisation, en particulier manuportée (apportée par les mains), du cathéter.

Il est recommandé de ne pas ouvrir les gélules en présence d'un patient en état critique ou immunodéprimé en raison du risque de contamination par l'air.

En effet, il a été rapporté chez des patients porteurs d'un cathéter veineux central et des patients en état critique ou immunodéprimés, même non traités par *S. boulardii*, de très rares cas de fongémies (passage de la levure dans le sang) se traduisant le plus souvent par de la fièvre et des hémocultures positives à *Saccharomyces*.

Concernant l'enfant de plus de 6 ans et l'adulte, vous devez consulter rapidement votre médecin dans les cas suivants :

- En l'absence d'amélioration au bout de 2 jours de traitement ;
- En cas d'apparition de fièvre, de vomissement ;
- En cas de présence de sang ou de glaire dans les selles ;
- En cas de soif intense, de sensation de langue sèche. En effet, ces signes montrent un début de déshydratation c'est à dire de perte importante de liquide due à la diarrhée. Votre médecin jugera alors de la nécessité de prescrire une réhydratation qui pourra se faire par voie orale ou intraveineuse.

### Précautions

Chez l'enfant de plus de 6 ans et l'adulte, ce traitement est un complément des règles diététiques :

- Se réhydrater par des boissons abondantes, salées ou sucrées, afin de compenser les pertes de liquide dues à la diarrhée (la ration quotidienne moyenne en eau de l'adulte est de 2 litres) ;
- S'alimenter le temps de la diarrhée,
  - o en excluant certains apports et particulièrement les crudités, les fruits, les légumes verts, les plats épicés, ainsi que les aliments ou boissons glacés,
  - o en privilégiant les viandes grillées, le riz.

En cas de doute, n'hésitez pas à consulter votre médecin ou votre pharmacien.

### **Enfants**

Sans objet.

### **Autres médicaments et ULTRA-LEVURE 50 mg, gélule**

Du fait de sa nature fongique, ne pas associer ce médicament à un antifongique (médicament actif contre les champignons) oral ou systémique.

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

### **ULTRA-LEVURE 50 mg, gélule avec des aliments et boissons**

ULTRA-LEVURE étant constitué de cellules vivantes, ne pas mélanger avec un liquide ou un aliment trop chaud (plus de 50°C), glacé ou alcoolisé.

### **Grossesse et allaitement**

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

Demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

### **Conduite de véhicules et utilisation de machines**

Sans objet.

### **ULTRA-LEVURE 50 mg, gélule contient du lactose monohydraté et du saccharose**

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

## **3. COMMENT PRENDRE ULTRA-LEVURE 50 mg, gélule ?**

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 6 ans.

La dose recommandée est de 4 gélules par jour, en deux prises.

Avaler les gélules avec un grand verre d'eau.

La lyophilisation de la substance active garantit la stabilité et la vitalité de *Saccharomyces boulardii* CNCM I-745.

### **Si vous avez pris plus d'ULTRA-LEVURE 50 mg, gélule que vous n'auriez dû**

Sans objet.

### **Si vous oubliez de prendre ULTRA-LEVURE 50 mg, gélule**

Sans objet.

### **Si vous arrêtez de prendre ULTRA-LEVURE 50 mg, gélule**

Sans objet.

## **4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?**

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

### **Effets indésirables très rares :**

- Réactions allergiques : réaction anaphylactique, voire choc, angioedème (gonflement des tissus du visage), rougeurs, démangeaisons.
- Passage de levure dans le sang (fongémie).

### **Effets indésirables rares :**

- Urticaire.

### **Effets indésirables de fréquence indéterminée :**

- Constipation.
- Infection grave du sang (sepsis).

### **Déclaration des effets secondaires**

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet: [www.signalement-sante.gouv.fr](http://www.signalement-sante.gouv.fr)

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

## **5. COMMENT CONSERVER ULTRA-LEVURE 50 mg, gélule ?**

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

Conserver à une température ne dépassant pas 25 °C, à l'abri de l'humidité.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'emballage après EXP. La date de péremption fait référence

au dernier jour de ce mois.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

## **6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS** ↗

### **Ce que contient ULTRA-LEVURE 50 mg, gélule** ↗

· La substance active est :

*Saccharomyces boulardii* CNCM I-745 \* ..... 50 mg

Pour une gélule.

\*cellules de levures

· Les autres composants sont :

**Contenu de la gélule**: lactose monohydraté, stéarate de magnésium, saccharose.

**Enveloppe de la gélule**: hypromellose.

**Encre d'impression de la gélule**: gomme laque, propylèneglycol, solution d'hydroxyde d'ammonium concentrée, hydroxyde de potassium, oxyde de fer noir (E172).

### **Qu'est-ce que ULTRA-LEVURE 50 mg, gélule et contenu de l'emballage extérieur** ↗

Ce médicament se présente sous forme de gélules, (flacon (verre) muni d'une cape (polyéthylène)).

Boîte de 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100 ou 200 gélules.

### **Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché** ↗

**BIOCODEX**  
7, AVENUE GALLIENI  
94250 GENTILLY  
FRANCE

### **Exploitant de l'autorisation de mise sur le marché** ↗

**BIOCODEX**  
7, AVENUE GALLIENI  
94250 GENTILLY  
FRANCE

### **Fabricant** ↗

**BIOCODEX**  
1, AVENUE BLAISE PASCAL  
60000 BEAUVAIS  
FRANCE

### **Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen** ↗

Sans objet.

### **La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :** ↗

[à compléter ultérieurement par le titulaire]

### **Autres** ↗

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'ANSM (France).

#### **Conseil d'éducation sanitaire :**

ULTRA-LEVURE est un complément des règles diététiques importantes :

· **Se réhydrater** par des boissons abondantes, salées ou sucrées,

· **Salimenter** le temps de la diarrhée, en privilégiant les viandes grillées, le riz.

#### **Qu'est-ce qu'une flore de substitution ?**

La flore intestinale est constituée de milliards de microorganismes. Son équilibre est nécessaire au maintien de certaines fonctions essentielles du tube digestif telles que la digestion des aliments, la défense contre les agents infectieux, la stimulation et le renforcement des défenses immunitaires.

Mais cet équilibre est fragile et peut être remis en cause par de nombreux facteurs : infections intestinales par un virus ou une bactérie, prise de certains médicaments tels que les antibiotiques, modifications des habitudes alimentaires... pouvant entraîner divers troubles digestifs dont la diarrhée. ULTRA-LEVURE est un médicament de la flore intestinale dit « flore de substitution » qui permet de compenser un déséquilibre transitoire de la flore intestinale.

[Retour en haut de la page](#) ↗

